

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43 - 09.27.46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 24 - 7 Août 1980.

Abonnement annuel : 60 F.

V I G N E

VERS DE LA GRAPPE : La courbe de vol commencée en début de mois, marque actuellement un palier avec des captures abondantes. Les conditions de ponte sont excellentes.

Effectuer un traitement de type préventif à compter du 10 août ; employer pour celui-ci des produits de longue rémanence (pyréthrinoides - acéphate etc...) compte tenu de l'étalement du vol et des dépôts de pontes qui continuent à l'heure actuelle, il sera nécessaire de prévoir une seconde intervention à compter du 20 août en situation précoce, vers le 25 août en situation plus tardive et dans l'Aube. Celle-ci devrait mettre en oeuvre des produits à action de choc (Parathion, méthomyl, trichlorfon, esters phosphoriques etc...).

POURRITURE GRISE : En dehors des traitements éventuellement réalisés avant fleur, le second traitement doit intervenir avant fermeture de la grappe.

ACARIENS : Les araignées rouges et jaunes sont favorisées par le temps chaud qui règne actuellement. Le traitement d'été devrait se situer aux environs du 15 août.

ROUGEOT - OIDIUM : Maintenir la protection visant ces deux parasites.

ARBORICULTURE FRUITIERE

CARPOCAPSE DES POMMES : Dans la période du 30 juillet au 5 août, nette augmentation des captures dans les pherotraps. Le vol se poursuit ; nous rappelons notre dernier avis conseillant une protection dans la 1ère quinzaine d'août, notamment à proximité d'arbres de plein vent.

MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES ET DES POIRES : Il s'agit d'assurer la protection des fruits contre les champignons latents du genre Gloeosporium, Trichoseptoria, Cylandrocarpon mali (parasites lenticellaires).

Une bonne protection est obtenue en pratiquant 2-3 pulvérisations de pré-cueillette, la première 30-40 jours avant récolte, la dernière 48 heures avant récolte.

Les matières actives utilisables sont : Bénomyl, Carbendazime, Methythiophanate, Captane, Thiabendazole.

GRANDE CULTURE

MIDIOU DE LA POMME DE TERRE : Bien que les conditions climatiques actuelles ne soient pas favorables à l'extension de la maladie, elle reste présente dans de nombreuses cultures. En effet les maxima enregistrés au cours de la dernière décade de juillet ont été insuffisamment élevés pour neutraliser les taches.

Il convient donc d'être très prudent et d'assurer à nouveau une bonne protection pour toutes les cultures à récolter ou à défaner après le 20 août. L'attention se portera en particulier sur les variétés féculières qui doivent être maintenues en végétation pendant encore une longue période.

MALADIES SUR BETTERAVE : Situation toujours stationnaire et peu inquiétante sur betteraves :
- Oidium et Cercosporiose non observés.
- Ramularia : taches très limitées.

Le Chef de la Circonscription,

J. DELATTRE.

Directeur-Gérant J. THIAULT, successeur de P. JOURNET.